



Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneđi
TURKISH SOCIETY FOR COLPOSCOPY AND CERVICAL PATHOLOGY

V. Ulusal Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Kongresi

7-10 Aralık 2017
Wyndham Grand, İzmir




Sitoloji Negatif/Non-hpv 16,18 Pozitif Hastalar Kadın Doğum Uzmanları İçin Tuzak Mıdır?

Dr.İbrahim Karaca

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H

Management of Women $\geq$ Age 30, who are Cytology Negative, but HPV Positive

Management of Women $\geq$ Age 30, who are Cytology Negative, but HPV Positive



© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved. ASCCP

Reprinted from: *The Journal of Lower Genital Tract Disease* Volume 17, Number 5, with the permission of ASCCP © American Society for Colposcopy and Cervical Pathology 2013. No copies of the algorithms may be made without the prior consent of ASCCP.

UpToDate®

Amaç

- Sitoloji negatif/non-Hpv 16,18 pozitif olan hastaları 1 yıl sonra koteste çağırmak yerine kolposkopi ve biyopsi yaparak CIN 2-3 lezyonları saptamak.

METHOD

- Temmuz 2015- Eylül 2017 tarihleri arasında
- Smear negatif / Hpv pozitif hastalar(544 hasta)
- 375'i (%68,9) Hpv16/18 pozitif
- 169 'u (% 31,1) non-Hpv 16,18 pozitif
- Retrospektif
- Kolposkopi ve servikal biyopsi

Sitoloji normal/HPV(+)

Biyopsi sonuçları	Sayı	Yüzde
Displazi saptanmayan	406	%74
CIN I	104	%20
CIN2-3	34	%6
Toplam	544	%100

Hpv Genotipleri ve Biyopsi Sonuçları

HPV genotipi	Displazi saptanmayan	CIN I	CIN 2-3
Hpv 16	188 (%34,5)	57(%10)	23(%4,2)
Hpv 18	45(%8)	19(%3)	5(%0,9)
Hpv16+18	22(%4)	12(%2,2)	4(%0,7)
Diğer tip (En sık Hpv 51)	151(%27)	16(%2,9)	2(%0,3)

Smear normal/ Hpv pozitif 544 hasta

Kolposkopik
Değerlendirilme

Displazi saptanmayan, 406 hasta
Hpv 16,18+ 255 hasta
Non-HPV16,18 + 151 hasta

CIN I , 104 hasta
Hpv 16,18 + 88 hasta
Non-HPV16,18 + 16 hasta

CIN 2-3 , 34 hasta
Hpv 16,18 + 32 hasta
Non-HPV16,18 + 2 hasta



CIN2-3 tesbit edilen 2 hastada Hpv 33 ve 35 pozitif saptanmıştır.

Hpv 16 ve Hpv 18 dışındaki diğer Hpv tiplerinden en sık Hpv 51 genotipi tesbit edilmiştir.(%14)

- Servikal sitoloji negatif /non-HPV 16,18 pozitif 169 kadını bir yıl sonra koteşte çağırarak yerine immediate kolposkopik biopsi yaparak bu kadınların %9,4'üne CIN I ve %1,1'ine CIN2-3 tanısı koyduk. Bu işlemler kolposkopi sayımızı yaklaşık %45 arttırdı.

TEŞEKKÜR EDERİM

